

Speciosa (Terebra), Desh. Proc. Zool. Soc., 1859, p. 279.
= T. Senegalensis, Lam.

TRYON 1885

18. TEREBRA SPECIOSA, Desh.

T. testa elongato-turrata, apice acuminato, flava, in margine anfractuum castaneo regulariter maculata; longitudinaliter tenuer plicata, anfractibus latis, planiusculis, sulco impresso, inaequilater bipartitis; margine suturali, late plicato, albescente; apertura elongato-angusta, subquadrata, basi profunde marginata; columella acuta, conoidea, extus angulo angusto, circumdata.

Hab. —?

Collection Cuming et la mienne.

DESH 1859 p 249

Par sa forme et sa coloration cette coquille se rapproche de la *Terebra festiva*: elle s'en distingue par plusieurs bons caractères; les tours sont élargis, peu convexes; le bourelet de la suture est assez large, peu proéminent, et il présente avec le reste de la surface un contraste assez remarquable: on y remarque en effet des plis larges, réguliers, blanchâtres, entre chacun desquels se dessine une tache d'un beau brun. Ces plis, au lieu d'être en même nombre que ceux du reste de la surface, occupent un espace beaucoup plus large, de telle sorte que chacun d'eux reçoit deux ou trois des plis qui parcourent la surface supérieure des tours.


Long. 39 mill., larg. 7.

DESH 1859 p 299

18. *T. speciosa* Desh. P.Z.S., 1859, 279. Hab. ? Types (2) B.M.
They are small, strongly marked ferruginea Born. ТЧЧ

182. *speciosa*, *Terebra* — DESHAYES, 1859, P. Z. S. L., p. 279 (non BEAN in THORPE, 1844). Hab. ? ("West Africa" on label). Coll. Cuming & Deshayes. Size: 39×7 mm. Holotype: 39.8×7.6 mm. = *T. senegalensis* LAMARCK, 1822. СС9

18. *T. speciosa*, Deshayes, young of *T. senegalensis*, Lamarck. RS 1860b



197c, Lecto-type of *T. speciosa* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 1979112; 39.8 mm (slender form). 197d, Lower whorls of paralectotype of *T. speciosa* Deshayes. BRAT 87