

8. TEREBRA SPLENDENS. Desh. (Pl. V, fig. 11.)

173

T. testa elongato-subulata, turrata, angusta, apice acutissima, nitente, laevigata; anfractibus latis, convexiusculis, sulco impresso bipartitis, primis tenue plicatis; area marginali paulo depressiore, unicolore, flavido rubente; area altera latiore, maculis flammulatis alternatim albis et flavido-rubescensibus ornata; apertura obliqua, semi ovata, angusta, basi late emarginata; columella parumper obliqua, intus plana, basi extus angulo acuto circumdata.

Patrie les mers de Chine.

On prendrait cette coquille pour une variété du *Terebra dimidiata*, elle en a à peu près la forme et la couleur. Elle en diffère par un volume moitié moindre, une forme en proportion plus étroite, le bourrelet marginal plus étroit et plus déprimé, les plis des premiers tours sont beaucoup moins profonds, enfin les taches sont beaucoup plus égales et plus régulières. Le bourrelet de la base de la columelle est beaucoup moins volumineux dans notre espèce, il se réduit à un angle aigu obliquement décurrent.

Notre plus grand échantillon a 75 millim. de long et 12 de diamètre.

Ma collection.

DESH 1857 73



11

31. TEREBRA SPLENDENS, Desh.

T. testa elongato-subulata, turrata, angusta, apice acutissimo, nitente, laevigata; anfractibus latis, convexiusculis, sulco impresso bipartita, primis tenue plicatis; area marginali paulo depressiore, unicolore, flavido-rubente; area altera latiore, maculis flammulatis alternatim albis et flavido-rubescensibus ornata; apertura obliqua, semi-ovata, angusta; basi late emarginata; columella parumper obliqua, intus plana, basi extus angulo acuto circumdata.

Long. 79 mill., larg. 12.


Hab. Les mers de la Chine.

Ma Collection.

DESH 1859 1281

TYPE IN ROULE DES MINES ? (T44)

31. *T. splendens*, Deshayes, variety of *T. dimidiata*, Lamarck. (1859)



9

Terebra splendens Deshayes, 1857, holotype, fig. 9. Figured by Deshayes, pl. 5, fig. 11. Dimensions 73.8 x 12.6 mm. Original measurements 75 x 12 mm. Type locality is China seas. This is *T. dimidiata* Linnaeus, 1758. BRANCHER 77 Vél 91(2) 141

FIG. 9. *Terebra splendens* Deshayes, 1859, holotype.

Le *Terebra splendens* Deshayes (Journ. de Conchyliologie, VI, 1857, p. 73, pl. V, fig. 11) que Tryon a cité comme variété du *dimidiata* se distingue assez de cette espèce par sa forme plus allongée, ses tours supérieurs plus finement sculptés, etc., pour maintenir sa séparation spécifique. 726 35 123

4. *Terebra splendens*, Desh. (= *dimidiata*). Jour. de Conch., 2d ser., ii, t. 5, f. 11, T. splendens Desh = dimidiata

Splendens (*Terebra*), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 73, pl. v, fig. 11. = *T. dimidiata*, Linn. 9

