

VOIR AFFINIS MUREL 1852 p 78

VOIR AFFINIS HINDS 1844 p 172

VOIR AFFINIS CERN 1962

TEREBRA STRIATA, Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr.

Les auteurs ignoraient que le nom de *striata* avait été donné par Basterot en 1825 à une espèce fossile de Bordeaux ; ils l'ont appliqué à une espèce vivante à laquelle le nom d'*affinis* a été donné par M. Gray. Ce qui n'a pas empêché ce dernier naturaliste d'attribuer ce nom de *striata* à une coquille depuis longtemps connue sous le nom de *babylonia* de Lamk. DALL 1853 p 320

STRIATA  
QUOY & GAIMARD  
1833  
= AFFINIS (65)  
T. n. 1835

Striata (Terebra), Quoy (not Basterot). Voy. de l'Astr., p. 468, t. 36, f. 23, 24. = T. affinis, Gray. . . . . 14

VIS STRIÉE.

*Terebra striata*, nob.

PLANCHE 36, FIGURES 23-24.

*Terebra, testa turrata, basi leviter ventricosa, albido fulvoque marmorata; anfractibus convexiusculis, superne sulco divisus, longitrorsum separatim striatis; ultimo anfractu linea rufa bicincto.*

Petite espèce, conique, assez peu pointue, légèrement ventrue à la base, dont les tours de spire sont larges, bifides, et tous séparément striés en long par des sillons profonds, rougeâtres, écartés les uns des autres, et qui, en passant d'un tour à l'autre, ne se correspondent pas toujours. Le ruban qui borde chaque tour près des sutures, devient tuberculeux vers la pointe de la spire. Une strie décurrente, double ou même triple sur le dernier tour, se perd insensiblement sur les autres.

L'ouverture est allongée, la columelle tordue, avec un pli très-oblique à la base. Le fond de la coquille est blanc avec des maculatures fauves, quadrilatères, allongées.

L'animal nous est inconnu, de même que la patrie de cette coquille, que nous supposons provenir des îles Carolines.

Un individu, assez semblable au nôtre, existe au Muséum, sous le nom de *Pertusa*, qui équivaut à peu près à celui que nous avons donné.



† 32. Vis striée. *Terebra striata*. Quoy. h 257

*T. testâ turratâ, basi leviter ventricosâ, albido fulvoque marmoratâ; anfractibus convexiusculis, superne sulco divisus, longitrorsum separatim striatis: ultimo anfractu lineâ rufâ bicincto.*  
Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 468. pl. 36. f. 23. 24. 1833.  
*Terebra affinis*. Gray. Proc. of Zool. Soc. 1834. p. 60.  
*Id.* Hinds. Proc. of Zool. Soc. 1844. p. 164. n° 66.  
Habite les Carolines?

Petite espèce, conique, assez peu pointue, légèrement ventrue à la base, dont les tours de spire sont larges, bifides, et tous séparément striés en long par des sillons profonds, rougeâtres, écartés les uns des autres, et qui, en passant d'un tour à l'autre, ne se correspondent pas toujours. Le ruban qui borde chaque tour près des sutures devient tuberculeux vers la pointe de la spire. Une strie décurrente, double ou même triple sur le dernier tour, se perd insensiblement sur les autres. L'ouverture est allongée, la columelle tordue, avec un pli très-oblique à la base. Le fond de la coquille est brun, avec des maculatures fauves, quadrilatères, allongées.

Cette coquille a 55 millimètres de long, et 9 de large.  
D d G. E 1845 p 257

DIMENSIONS.

	pouces.	lignes.
Longueur.....	I	10 1/2
Épaisseur à la base.....		4

Q 26-1832 1464