

TEREBRA TAENIOLATA, Quoy et Gaim.

Double emploi de la *Terebra tricolor* de Sowerby. DWH 1257
p 320

19. VIS RUBANÉE, *Terebra taeniolata*, Quoy.

(Collect. du Mus.) *Voy. de l'Astr.*, pl. 36, fig. 25-26.

Pl. XIII, fig. 33.

Taeniolata (*Terebra*), Quoy. *Voy. de l'Astrol.*, p. 466, t. 36, f. 25, 26. = *T. tricolor*, Sow. 28

TRON 85

T. testâ turrîto-subulatâ, angustâ, longitudinaliter tenuissimè striatâ, roseâ, taeniâ rubrâ bicinctâ; anfractibus convexiusculis, supernè sulco impresso divisîs et albo cinctis; columellâ lamellosâ.


Coquille allongée, turriculée, fort aiguë au sommet. La spire se compose de dix-huit à vingt tours très-étroits, à peine convexes, sur lesquels on remarque deux sillons transverses très-espacés, dont le supérieur sépare nettement un bourrelet qui borde la suture; celle-ci est linéaire, légèrement enfoncée et très-finement crénelée. Le dernier tour est court, pourvu de trois sillons, dont l'un est situé sur le milieu de la convexité; une multitude de stries longitudinales régulières et ondulées sont répandues sur toute la surface de cette coquille. L'ouverture est jaunâtre, plus haute que large, ovale-oblongue, rétrécie aux extrémités; le bord droit est mince et tranchant; la columelle étroite, arquée dans sa longueur, contournée vers l'extrémité; le canal de la base est peu profond et légèrement proéminent en dessus. La coloration de cette coquille est un joli fond rosé, traversé par les sillons violets, tandis que les bourrelets qui bordent chaque suture sont d'un beau blanc.

Long. 26 lignes.

Habite Tonga-Tabou.

Cette espèce, rare et élégante, que l'on doit aux recherches de M. Quoy, dans son dernier voyage autour du monde, est fort remarquable par la ceinture blanche qui borde la suture.

KN 1232-33 p 29



35. V. rubanée (*Taeniolata*)

VIS RUBANÉE.


Terebra taeniolata, nob.

PLANCHE 36, FIGURES 25-26.

Terebra, testa turrîto-subulatâ, angustâ, longitudinaliter striatâ, roseâ, taeniola rubra bicinctâ; anfractibus convexiusculis superne sulco impresso divisîs et albo cinctis; columella lamellosa.



95



95

Petite espèce très-élégante, non ventrue, dont les tours sont larges, séparément striés en long, élevés, bifides, c'est-à-dire divisés près de leur sommet par une strie décurrente, formant un ruban d'un blanc jaunâtre sur un fond rose. Un petit ruban rouge très-étroit parcourt tous les tours en touchant presque les sutures: il est double au dernier; et comme il n'est pas plus large que la strie dont nous venons de parler, il rend la coquille comme doublement cerclée. La bouche est ovale, entière, c'est-à-dire qu'une lamelle qui recouvre la columelle se joint au bord droit.

Cette coquille, dont nous ne connaissons point l'animal, se trouve à Tonga-Tabou.

DIMENSIONS.

	pouces.	lignes.
Longueur.....	2	2
Épaisseur à la base.....	"	4

QdG 1832/466



31a

Br. 87

31a, Holotype of *T. taeniolata* Quoy & Gaimard, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, 56.7 mm.