

*T. taiwanensis* Aubry, 1999

(n. sp.)

**Materiale esaminato**

n. 20 esemplari dragati a profondità variabile da 50 a 100 m, in prossimità di Kue Shan Is. NE di Taiwan.

**Descrizione**

Conchiglia d'aspetto solido. Le misure dei molti esemplari da me esaminati, variano da 20 a 31 mm di lunghezza e da 5 a 8 di larghezza massima. Il colore è generalmente marrone ma ho potuto osservare esemplari color avorio chiaro. La protoconca, alquanto mammillata, è formata da 2,5 giri e la teleoconca da 14 giri, il profilo dei quali è leggermente concavo. La banda sottosuturale è formata da due giri, separati da un profondo solco. Il giro distale come anche quello prossimale sono formati da piccole costolature. Tre solchi demarcano la spira evidenziando tre coroncine spirali. La porzione prossimale dell'ultimo giro è marcata da una banda di colore più scuro. La columella è curva, l'apertura quadrata.

**Olotipo**

22 x 6 mm (Aubry coll.)

**Paratipi**

n. 19 esempl. (Aubry coll.)

**Località tipo**

Kue Shan Is. NE di Taiwan. Raccolte ad una profondità variabile da 50 a 100 m. Distribuzione sconosciuta.

**Discussione**

Può a prima vista essere confusa con *T. funiculata* (Hinds 1844) e suoi sinonimi *T. langfordi* Pilsbry, 1921, *T. archimedis* Deshayes, 1859; ma diversi caratteri conchigliari quali: protoconca, banda sottosuturale, ornamentazione ne fanno una specie distinta.

---

*T. taiwanensis* Aubry, 1999

(n. sp.)

**Material examined**

Twenty specimens dredged at from 50 to 100 metres. Near Kue Shan Is. NE of Taiwan.

**Description**

A shell of solid appearance. The measurements of the many specimens examined vary from a maximum 20 to 31 mm in length and from 5 to 8 mm in width. The colour is generally brown but several specimens of a pale ivory colour have been seen. The protoconch, fairly noduled is formed of 2.5 whorls and the teleoconch of 14 whorls, the profile of which is slightly concave. The sub-sutural band is formed of 2 whorls by a deep groove. The distal whorl, like its neighbour, is formed of small ribs. Three grooves demarcate the spiral showing three small spiral crowns. The portion next to the last whorl is marked by a band darker in colour. The columella is curved, the aperture square.

**Holotype**

22 x 6 mm (Aubry coll.)

**Paratypes**

n. 19 specimens (Aubry coll.)

**Type locality**

Kue Shan Is. NE of Taiwan. Gathered at depths varying from 50 to 100 m The distribution is unknown.

**Discussion**

At first sight *T. taiwanensis* can be confused with *T. funiculata* (Hinds, 1844) and its synonyms *T. langfordi* Pilsbry, 1921, *T. archimedis* Deshayes, 1859; but various conchological characteristics such as the protoconch, the sub-sutural band and the decoration make it a distinctive species.