

*T. tigrina*, Gmelin

REEVE, Conch. icon., *Terebra*, f. 8.

Timor; un exemplaire. **NOBRE 1908**

TIGERINA 1)  
GML 1791 (17)

(= FELINA)

12. *T. TIGRINA*. (pl. xlii. f. 30.) Gray, l. c. p. 59. *Buccinum tigrinum*, (bis.) Gmelin, No. 135. *B. felinum*, Dillwyn, v. ii. *Terebra felina*, Sowerby, Tank. Cat. p. 76.

Testâ conico-subulatâ, acuminatâ, lævigatâ, albâ, uniseriatim maculatâ; anfractibus planulatis, supernè lineâ impressâ divisis, infernè maculis rufis unicinctis, anfractu ultimo iteratis; aperturâ ovali, effusâ; columellâ brevisculâ, nudâ.

Shell conico-subulate, acuminate, smooth, white on the inferior part of the whorl, with a single series of reddish-brown spots; whorls flat, distinctly girdled, smooth and polished, the last fuller than usual, and with two rows of spots. Aperture oval, effuse, without any canal. Columella rather short, naked, and a little twisted.

It would seem quite time that attention was drawn to some of these long known shells, since they continue almost scarce in collections, and we are not satisfied, as in the present case, that their native country is correctly known.



H. 18446-T.C. p 155 t XLii f. 3a

12. *TEREBRA TIGRINA*, Gmelin (sp.).  
*Buccinum tigrinum* (bis), Gmelin, No. 135. 140!!  
*B. felinum*, Dillwyn, vol. ii.  
*Terebra felina*, Sowerby, Tank. Cat. p. 76.  
Hab. —? (v. s. in m. Cuming.)

H 44 a p 160

29. *TEREBRA TIGRINA*, Desh.

*Terebra tigrina*, Desh. dans Lamk. au. s. Vert. 2 ed. t. 10. p. 253.  
*Buccinum tigrinum*, Gmel. p. 2602. 350!!  
*Buccinum felinum*, Dillw. Cat. t. 2. p. 644. no. 135.  
*Terebra muscaria*, var.  $\beta$ , Kiener, Icon. des Coq. Viv. pl. 3. f. 4.  
Hab. Ocean indien. D 25 H 1857 p 281

97. *TEREBRA TIGRINA*, Gmelin. Beautiful examples, with operculum; but not showing any variation. A not uncommon Polynesian form: we have recently seen it from the Loyalty Islands, New Caledonia.

M & S K.

445. — *tigrina*? Desh. Individu mort, décoloré, peu déterminable. Desh. 1763

9. *Terebra* (*Oxymeres*) *tigrina* (Gmelin) **Hirase 34**  
Height 76 mm.; diam. maj. 20.5 mm., min. 19 mm.



*Vis tigrine, Terebra tigrina.*  
Demi-transparente, blanche, ponctuée de roux; chaque tour de spire un peu émarginé sur le dos.  
*Buccinum tigrinum*. Linn. — Seba, Mus. 3. tab. 56. fig. G. Gualt. Test. tab. 56. fig. G. Martini, 4. tab. 154. fig. 1448.  
On ignore son pays natal. Bosc 1761 p 11

† 26. *Vis tigrine. Terebra tigrina*. Desh. p 152  
*T. testâ turrilo-subulatâ, lævi, albâ, nitidâ, rubro uniseriatim maculatâ; maculis quadrangularibus, anfractibus planulatis, transversim bipartitis: ultimo biseriatis maculato; aperturâ angustâ, columellâ brevi, conicâ, basi uniplicatâ.*

*Buccinum tigrinum*. Gmel. p. 2602.  
Schrot. Einl. t. 1. p. 401. *Buccinum* n° 170.  
Gualt. Index. pl. 56. f. G.  
Seba. Thes. t. 3. pl. 56. f. A.  
Martini. Conch. t. 4. p. 297. pl. 154. f. 1448.  
*Buccinum felinum*. Dillw. Cat. t. 2. p. 644. n° 135.  
*Buccinum tigrinum*. Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 132.  
*Terebra muscaria*. Var.  $\beta$ . Kiener. Spec. des Coq. pl. 3. f. 46.  
*Id.* Küster. Conch. Cab. pl. 1. f. 3.  
Habite....

Comme le témoigne cette synonymie, cette espèce, connue de quelques-uns des anciens conchyliologues, a été inscrite par Gmelin, dans son Catalogue, sous le nom de *Buccinum tigrinum*, que nous conservons à l'espèce. Depuis, M. Dillwin lui a donné celui de *Buccinum felinum*, et enfin M. Kiener, et à son exemple M. Küster, ont regardé cette espèce comme une variété du *Terebra muscaria*. Cependant elle se distingue très nettement, et nous avons déjà vu un assez grand nombre d'individus pour nous permettre de constater l'identité et la constance de ses caractères.

Cette espèce reste toujours beaucoup plus petite que le *Muscaria*, elle est aussi en proportion plus large à la base; elle est allongée, subulée; ses bords sont aplatis et partagés en deux parties inégales par un sillon transverse. Dans la plupart des individus et surtout dans les jeunes, ce sillon est ponctué. La suture l'est également, et quelquefois elle est garnie de très fines écailles. Son ouverture est oblongue, courte, et un peu dilatée; son bord droit est très mince, très oblique, à l'axe longitudinal, et sinueux en forme de S italique très allongée. La columelle est conique, large à la base, pointue au sommet. Elle présente, à la base et du côté interne, une sorte de méplat, résultant d'une érosion que l'animal fait subir à sa coquille. Cette columelle, qui est plus courte que l'extrémité du bord droit, porte, à son extrémité, un petit pli oblique. Toute cette coquille est d'un beau blanc; elle a, dans ses reflets, quelque chose d'opalin; elle est ornée immédiatement au-dessus de la suture, d'une seule rangée de taches quadrangulaires, d'un rouge ferrugineux. A la base du dernier tour, se montre un second rang de taches semblables aux premières.

Assez rare dans les collections. Cette espèce a 64 millim. de long, et 17 de large. D 8 R. E 1845 p 252-253

1205 | 30 *E. Tigrinum*. Das dünne Tiegeibein.  
Gmel. *Buccinum tigrinum*. sp. 140.  
Martini 4 t. 154. f. 1448. 3 St.

R 0 P 1798 p 94

*tigrinum*. 188. *B. testa ovata lævi caerulefcente: fasciis transversis luteis fusco maculatis characteribusque fuscis intermediis.* Martyn. univ. Conchol. 1. t. 8. **GML 1791 p 3475**  
Habitat ad novam Seelandiam.  
THIS IS A PAPHIUM = DOUBLE USE BY Gmel. (SEE DORRIST p 120)

NOT  
A TEREBRA


*tigrinum*. 140. *B. testa pellucida alba rufescenti-punctata: anfractibus fingulis dorso submarginatis.*  
Gualt. test. 1. 56. f. G.  
Seb. mus. 3. t. 56. f. A.  
Martin. Conch. 4. t. 154. f. 1448.  
Habitat - - - testa minuta. **GML 1731 p 3502**

TIGERINA  
6112-1791  
= FELINA 17



Fig. 1207.  
T. tigrina.

(=SOBOLA)  
CHENU 1899



8.

R. V. 1860

Species 8. (Mus. Cuming.)

TEREBRA TIGRINA. *Ter. testá conico-subulatá, solidiusculá, carneo-albá, maculis rufis supra suturas uniseriatim cinctá, ad basin biseriata, anfractibus lævibus, sulco divisís; aperturá breviusculá, columellá subcontortá.*

THE TIGER-SPOTTED TEREBRA. Shell conically subulate, rather solid, flesh-tinted, white, encircled above the sutures with a single row of red spots, at the base two rows, whorls smooth, divided by a groove; aperture rather short, columella somewhat twisted.

*Buccinum tigrinum*, Gmelin, Syst. Nat. p. 2602.

*Terebra tigrina*, Deshayes.

*Buccinum felinum*, Dillwyn.

*Terebra felina*, Sowerby.

Hab. West Indies.

Of very simple character, encircled throughout immediately above the sutures with a neat necklace of rust-red spots.



T. tigrina  
Gmel

Tigrina (Terebra), Gmelin. Syst. Nat., p. 2602, . . . 10

T. TIGRINA, Gmelin. Pl. 1, fig. 11.

Shell white, with a single row of chestnut spots just above the sutures, two rows on the last whorl, of which the lower one near the base, is smaller; surface smooth, an unornamented band below the sutures is defined by an impressed line.

Length, 2-3 inches.

Sandwich Islands, Central Polynesia.

Reeve's locality, West Indies, is erroneous. TAYLOR 1860

11. Terebra tigrina, Gmel. Sowb., Thes. Conch., f. 30.

Tiger Spotted Auger (*Terebra tigrina*, Fig. 2). Conically tapering, rather solid, white or flesh coloured, encircled above suture with single row of red-chestnut spots (body whorl has two rows). Whorls smooth with dividing groove in each. Columella somewhat twisted. Necklace of spots above suture immediately distinguishes this species. About 3 inches long. Indo-Pacific to northern Australia.

J. ALLAN 1894  
J. ALLAN

TEREBRA TIGRINA, Gmelin.

Tryon, loc. cit., p. 10, pl. i., fig. 11.

Mr. G. Sweet obtained two examples. Reported by Tryon from Hawaii, and represented in this Museum from the New Hebrides.

HEDLEY 1899 p. 481

Terebra tigrina Gmelin. Chemn. IV. Fig. 1448. Kien. Fig. 4b. Reeve Fig. 8.

Martens Südseeconchylien S. 23. Desh. 132 Reunion? Lien. 29 Mauritius. 17

MARTENS 1880 p. 489

Terebra tigrina Gmel

17

Chemn conch tab IV fig 1448. Buccinum tigrinum Gmelin Linn syst nat ed XIII p 2602. B. felinum

Dillwyn catalogue of shells p 644. T. muscaria var Kiener iconogr pl 3 fig 4<sup>b</sup>. T. tigrina

Deshayes Lam An sans Vert ed 2 X 253. Sowerby thes. fig 30. Reeve conch ic fig 8.

Fundort: Kingmill Inseln. Chemnitz Deshayes Sowerby kannten das Vaterland dieser Art nicht. Reeve gibt, vermuthlich fälschlich, Westindien an. Im Berl Zool Mus sind Exempl aus dem ind Ocean, durch Lamare Piquot erhalten.

MARTENS & LANGKAVEL 1841 p. 27