

## *T. valentinae* Aubry, 1999

(n. sp.)

### **Materiale esaminato**

n. 2 esemplari raccolti da subacquei in sabbia a 10 m di profondità, nel mare dell'Is. des Pines, in Nuova Caledonia.

### **Descrizione**

Conchiglia leggera e di aspetto delicato. La lunghezza varia dai 25,4 ai 30 mm e la larghezza dai 6 ai 7 mm. La protoconca è composta da 1,5 giri. La teleoconca da 13 giri, il cui profilo si presenta alquanto convesso. Il solco soprasuturale è ben marcato e delimita posteriormente una banda sottosuturale piatta, formata da due giri di piccole costole, separati fra loro da una fila spirale puntiforme. Il giro posteriore è più lungo e più evidente. Il colore di fondo è bianco tingeggiato sui giri da diverse flammule arancio scuro. Alcune macchiette puntiformi dello stesso colore si notano sul cordoncino posteriore della banda sottosuturale. Tre file spirali puntiformi e parallele solcano i giri. La punteggiatura cade fra le costole assiali che disegnano, pur non essendo molto rilevate, le spire. Queste costole tendono a scomparire sui giri in prossimità di quello corporale, sul quale non sono più presenti. La columella è curva e presenta una evidente piega columellare, l'apertura è ovale.

### **Olotipo**

25,4 x 6 mm (Pellifroni, coll.)

### **Paratipo**

n. 1 esempl. (Aubry, coll.)

### **Località tipo**

Baie Oro - Is. des Pines. Nuova Caledonia.

### **Discussione**

*T. valentinae* potrebbe confrontarsi preferibilmente con *T. marmorata* (Deshayes, 1859) e *T. montgomerji* R.D. Burch, 1965. Altre specie non sono da prendersi in considerazione date le evidenti differenze conchigliari.

---

## *T. valentinae* Aubry, 1999

(n. sp.)

### **Material examined**

Two specimens founds in sand by underwater divers a 10 metres of depth Is. des Pines. New Caledonie.

### **Description**

A light shell of delicate appearance. The length varies between 25.4 and 30 mm and the width between 6 and 7. The protoconch is composed of 1.5 whorls. The teleoconch is of 13 whorls, whose profile appears rather convex. The supersutural furrow is clearly marked, and defines a flat subsutural band at the back formed by two whorls of small ribs, separated from each other by a spiral, punctiform string. The rear whorl is longer and more apparent.

The background colour is white, painted on the whorls by several deep orange flame - shaped marks.

A few punctiform marks of the same colouring can be seen on the rear edging of the sub-sutural band. Three parallel rows of punctiform spirals furrow the whorls. The speckling disappears between the axial ribs that although not very prominent, outline the spires. These ribs tend to disappear on the whorls close to the corporal one, on which they are no longer present. The columella is curved and represents a clear fold of the columella, the opening is oval.

### **Holotype**

25,4 x 6 mm (Pellifroni, coll.)

### **Paratype**

n. 1 specimen (Aubry, coll.)

### **Type locality**

Baie Oro - Is. des Pines. New Caledonie.

### **Discussion**

*T. valentinae* could preferably be with compared *T. marmorata* (Deshayes, 1859) and *T. montgomerji* R.D. Burch, 1965. Other species cannot be taken into consideration given the evident conchological differences between them.