

T. westralica Aubry, 1999

(n. sp.)

Materiale esaminato

n. 6 esemplari raccolti da subacquei in sabbia a 10 m di profondità.

Descrizione

Conchiglia piccola, le cui dimensioni negli esemplari studiati, variano da 4 mm a 6,8 mm di lunghezza massima e da 1,5 mm a 2 mm di larghezza. La protoconca è formata da 2 giri e la teleoconca da 7 giri. Il solco suturale è ben visibile mentre la banda sottosuturale poco si evidenzia e le costolature, in numero di 10, su di essa presenti, sono il prosieguo delle costole che attraversano assialmente i giri. Non si notano linee o spire trasverse. Il colore di fondo varia dal bruno chiaro fino al quasi nero. L'aspetto generale della conchiglia è solido. L'apertura ovale e la columella dritta.

Olotipo

6,8 x 2 m. (Aubry, coll)

Paratipi

n. 5 esempl. (Aubry, coll)

Località tipo

Yanchep, presso Sorrento Beach, West Australia.

Discussione

L'unico paragone che può farsi è con *H. tiedemani* R.D Burch, 1965, sinonimo di *H. philippiana* Deshayes, 1859, ma già le differenze a livello generico ne escludono la possibilità di un accostamento sistematico. Forme giovanili di *D. duplicata* (Linnaeus, 1758) non sono da prendersi in considerazione.

T. westralica Aubry, 1999

(n. sp.)

Material examined

Six specimens found by underwater divers, in sand at a depth of 10 m.

Description

A small shell, whose size in the examples studied varies between 4 mm and 6.8 mm in length and between 1.5 mm and 2 mm in width, at maximum. The protoconch is formed of 2 whorls and the teleoconch of 7 whorls. The sutural groove is clearly visible whilst the sub-sutural band is not clear and the ribs, 10 in number, which are present on it, are the continuation of the ribs that cross the twists transversally. Transversal lines or spirals are not apparent. The basic colour varies between light brown and a tint that is almost black.

The general appearance of the shell is solid. The aperture is oval and the columella is straight.

Holotype

6.8 x 2 mm (Aubry, coll)

Paratypes

n. 5 specimens (Aubry, coll)

Type Locality

Yanchep, close Sorrento Beach, West Australia.

Discussion

The only other comparable species is *T. tiedemani* R.D. Burch, 1965 (synonymus with *H. philippiana* Deshayes, 1859), but the differences at general level are substantial and exclude the possibility of systematic matching. Young examples of *D. duplicata* (Linnaeus, 1758) are not to be taken into consideration.