


TEREBRA (*Myurella*) ACUARIA Toula.

(Pl. I, fig. 19-24).

1911. *Terebra acuaria* TOULA, Junglert. von Gatun, II, p. 19, pl. II, fig. 19.

Bien que nos échantillons paraissent ornés de côtes un peu plus obliquement incurvées que ne l'indique la figure de cette espèce du Miocène de Panama, je n'ose-rais les en séparer, car leur ornementation me semble identique : des côtes nombreuses et curvilignes, coupées par un sillon profond qui forme un bourrelet supra-sutural, égal au tiers de la hauteur de chaque tour; en outre, quatre ou cinq costules spirales dans les intervalles de ces côtes, sur la région antérieure. Les espèces de ce groupe sont nombreuses et variables, et les échantillons de la Martinique ressemblent aussi beaucoup à *T. Souleyeti* Desh. qui est cependant moins étroite, et à *T. Mariesi* Smith, et à *T. subtextilis* Smith, du Japon. Mais ils s'écartent complètement de *T. dislocata* Say, des côtes d'Amérique, qui a une forme beaucoup plus trapue, et dont les côtes ne se correspondent pas exactement sur la région antérieure et sur le bourrelet inférieur, ce qui lui a valu son nom. Aussi je ne comprends pas comment Tryon a pu y réunir *T. Souleyeti*, chez lequel les côtes semblent continues, comme celles de notre fossile. Taille max. : 36 mill. sur 5 mill.



*Localité.* — La Martinique, abondante, surtout non adulte; plésiotypes figurés (Pl. I, fig. 19-23), coll. Cossmann.

A titre de comparaison, je fais figurer (Pl. I, fig. 24, coll. de l'Ecole des Mines) un spécimen de *T. acuaria*, de Monkey Hill (Panama), dont l'ouverture est intacte et qui porte une forte carène sur le cou; il semble toutefois un peu plus étroit que les spécimens de la Martinique.

Cossmann 1913 pl.

19-23. *Terebra (Myurella) acuaria* Toula. — 1/1 et 2/1. 12  
 24. — — — — Monkey Hill..... 1/1..... 12