



9

10

9, 10. *Terebra continuicosta*, Cossm. - 1 -**Terebra (Myurella) CONTINUICOSTA, nov. sp.**

Pl. II, fig. 9-10.

T. testa angusta, acuminata, subconoidali; apice laevigato, obtuso, pedalam applanato; anfractibus parum convexis, sutura lineari separatis, costulis continuis ac sinuosis, ornatis, sulco interdum inaequaliter divisis, et striis spiralibus sex aut septem obsolete, notatis. Ultimo anfractu elevato, ad basim ovoideo, striis antice densioribus et costulis evanescentibus; apertura rhomboidali, lateraliter marginibus parallelis cincta; labro tenui, subsinuoso, labio calloso et buplicato; sinu basali profunde emarginato.

Taille au dessous de la moyenne; forme étroite, acuminée, spire longue, à galbe un peu conoidal; protoconque lisse, paucispirée, obtuse au sommet qui est un peu aplati; 15 tours à peine convexes, dont la hauteur atteint presque les trois quarts de la largeur, séparés par des sutures linéaires, peu profondes, ondulées par les costules axiales qui sont assez minces, régulièrement sinuées, et qui s'étendent, sans discontinuité, d'une suture à l'autre; aux deux cinquièmes de la hauteur de chaque tour, du côté postérieur, une série d'entailles spirales, visibles seulement dans les intervalles des costules, forment un sillon discontinu, qui limite la bande suprasuturale, et vis-à-vis duquel les côtes ininterrompues éprouvent seulement une

inflexion de sens; enfin l'ornementation est complétée par des stries peu profondes et obsolètes, au nombre de quatre ou cinq sur la région antérieure, et de deux ou trois sur la bande postérieure.

Dernier tour très-élevé, ovoïde à la base, sur laquelle les stries spirales se resserrent davantage, tandis que les côtes disparaissent à peu près complètement, sans atteindre la carène qui limite les accroissements de l'échancrure basale; ouverture rhomboïdale, à bords latéraux parallèles, étroitement canaliculée dans l'angle inférieur, profondément échancrée à son extrémité antérieure; labre assez mince, presque vertical, un peu sinueux comme les côtes; columelle droite, munie d'un mince pli antérieur, et d'un renflement épais, peu saillant, vis-à-vis l'enfoncement spiral de la carène basale, sous le bord columellaire, qui est calleux, vernissé, limité à l'extérieur par une étroite rainure.

Dim. — Longueur, 24 mill.; diamètre, 4 mill. à peine.

Rapp. et diff. — Parmi les *Myurella* vivants, à côtes non interrompues, je ne vois guère que *T. affinis* Gray, des Philippines et des Séchelles, qui puisse être comparé à notre espèce; mais cette coquille est beaucoup plus trapue; en outre, elle ne paraît pas ornée de stries spirales. Il y a aussi *T. subtextilis* Smith, du Japon, qui ressemble un peu au fossile de Karikal; mais ce dernier est encore plus étroit, ses côtes axiales paraissent plus saillantes, et surtout son dernier tour est beaucoup plus élevé, puisqu'il atteint presque le tiers de la longueur totale, quand on le mesure de face, tandis que le dernier tour de *T. subtextilis* est à peine égal aux deux septièmes de la longueur de la coquille; d'ailleurs, Tryon indique l'existence de dix stries spirales, tandis qu'il n'y en a jamais plus de sept ou huit au plus, chez *T. continuicosta*.

Assez rare, trois échantillons. COSMANN 1900 p 24