

Terebra dahanaensis spec. nov.


Tab. 14; Fig. 4, 4a. p. 224

Schaal zeer spits, uit vlakke, langzaam aangroeiende omgangen bestaande, die door de uitstekende naadbanden trapsgewijze tegen elkaar zijn afgezet en waarvan er 14 zijn bewaard. Er zijn 2 naadbanden; een breede langs de sutuur, daarvoor een veel smallere, die eerst door een nauwe, later door een breede tusschenruimte van de eerste is gescheiden. Beide banden samen nemen bijna de helft van de oppervlakte der omgangen in. Deze dragen een getraliede sculptuur. Scherp gesneden, zwak s-vormig gebogen dwarsribben, die op de beide banden in vlakke, scheefgerichte knopen veranderen, voor de banden echter slechts weinig scheef ten opzichte van de as der schaal staan, op den achtersten naadband tusschen de knopen 4 spiralen, waarvan de voorste op de jongere omgangen door een ondiepe, overlansche groeve in tweeën wordt gedeeld; op de oudere omgangen zijn ze onduidelijk en op de alleroudste in 't geheel niet voorhanden.

Ook de voorste naadband wordt op de jongere windingen door een overlansche groeve in tweeën gedeeld. Het voorste gedeelte der omgangen eindelijk draagt 3 spiraalbanden, soms ook nog een 4^e, die onmiddelijk tegen de voorste sutuur te voorschijn komt. Deze spiraalbanden zijn op de oudere omgangen breeder dan hunne tusschenruimten, op de jongere daarentegen over 't algemeen smaller. Op den slotomgang volgen voor de naadlijn nog een aantal smallere spiralen, terwijl heel fijne op de jongere omgangen in de ruimte tusschen de beide naadbanden voorkomen. Groeistreepen duidelijk. Rechterlip niet bewaard. Mondopening met duidelijk kanaal. De rand der columella vormt een zwakke plooi. Sporen eener roode kleur zijn bewaard.

Van de levende soorten is er geen nauw verwant te noemen. Van *Terebra Jenkinsi* Mart. (Samml. III, pag. 75, tab. 5, fig. 79. — Tertiärschichten pag. 34, tab. 6, fig. 14) en *Terebra pamotanensis* Mart. (Fossilien v. Java pag. 284, tab. 42, fig. 681) verschilt het fossiel van Nias daardoor, dat hier de getraliede sculptuur op het voorste gedeelte der omgangen en de spiraalsculptuur op den achtersten band veel duidelijker is. Bij *T. Jenkinsi* is bovendien de afstand tusschen de beide banden kleiner.

Eén exemplaar van Dahana. Icke & Martin 1912 p. 224

Fig. 4, 4a. *Terebra dahanaensis* Icke. 4a voorlaatste omgang 3× vergr.