

MODESTA  
TRISTAN 1829



2 *T. modesta*,  
BOUCHET 1981

SUBULA MODESTA (TRISTAN).  
(Tav. I, fig. 24).

(1829. DEFRANCE, *Dict. Sc. Nat.* Vol. 58, pag. 288).

1847. *Terebra plicaria* Bast. — SISMONDA, *Syn. meth.*, 2<sup>e</sup> ed., p. 28.  
1862. » » » e var. — DODERLEIN, *Giac. terr. mioc. sup.*, p. 23.  
1873. » *modesta* Defr.? — FISCHER et TOURNOUER, *Inv. foss. M. Leberon*, p. 125.

*Tortoniano*: Stazzano, S. Agata, Montegibbio (frequente).

OSSERVAZIONI. — È assai interessante osservare come questa specie sia quasi caratteristica del *Tortoniano* in quasi tutta l'Europa. Siccome essa è assai variabile, nè esiste alcuna figura della forma tipica del TRISTAN, così riferisco a tale specie gli esemplari di forma intermedia fra le diverse varietà, e che meglio corrispondono alla breve diagnosi data dal DEFRANCE e dal DUJARDIN (che l'indicò come *T. faval*); d'altronde tale forma è la più comune ed è quindi probabile che corrisponda in gran parte al tipo.


Ad ogni modo do la figura della forma piemontese, affinché nel caso si trovasse il tipo del TRISTAN e differisse da essa, si possa riconoscere tale differenza.

Nel bacino di Vienna e nel Portogallo esiste pure questa forma, come lo indicano le figure 15 e 17 della tav. II del noto lavoro del M. HERNES, e la fig. 14 di tav. XII del lavoro di DA COSTA « Mol. fos. de Port. », tanto detti autori come i paleontologi piemontesi posero finora questa forma fra le *T. fuscata*, da cui credo giusto di staccarla specificamente. Riguardo agli individui giovani riesce sovente difficile distinguere quelli della forma tipica da quelli delle sue varietà; in generale essi sono assai sovente scalarati.

Subv. DERTOGIGANTEA SACC. — *Testa major, crassior, fusiformis.* — Long. 11-12 Mm.  
Lat. 25-25 Mm.

*Tortoniano*: Stazzano (rara).

SACCO 1891 p. 15



24.	»	<i>modesta</i> (Trist.)	.....	»	.....	Museo geol. di Torino.
25.	»	var. <i>planoclavata</i> Sacc.	.....	»	.....	Museo geol. di Roma.
26.	»	var. <i>perinflata</i> Sacc.	.....	»	.....	Museo geol. di Torino.
27.	»	var. <i>dertofusulata</i> Sacc.	.....	»	.....	Museo geol. di Torino.
28.	»	var. <i>ovulata</i> Sacc.	.....	»	.....	»

+ DERTOGIGANTEA SACCO 1891  
INFERNELATA " "

\*75. *Terebra (Subula) modesta* (Trist.).

Kostej, o. nähr. Fundort, 2 St. Lapugy: Valea coşului  
4 St. Vöslau: 3 St.

Von dieser grossen Schnecke, auf deren Vorkommen im österr.-ungarischen Miocän zuerst Sacco, *Moll. Terz. Piem.* Bd. 10, 1891, pag. 15 aufmerksam gemacht hat, liegt ein erw. Stück von etwa 110 mm Länge und 25 mm Durchmesser vor, das die Existenz dieser Art auch bei Kostej erweist.

BOETTGER 1906 p. 21