

**TEREBRUM NEGLECTUM (MICHT.).**  
(Tav. I, fig. 63).

*T. testa turrato-subulata; anfractibus planulatis, angustatis, longitudinaliter plicatis; plicis obliquis, superne sulco impresso divisis; suturis marginatis; margine plicis subnodulosis instructo (MICHELOTTI).*

Long. 26-50 Mm. Lat. 8-9 Mm.


1847. *Terebra neglecta* Micht. — MICHELOTTI, *Foss. Mioc.*, p. 214. Tav. XVII, fig. 8.  
 1847. » » » — SISMONDA, *Syn. meth.*, 2<sup>e</sup> ed. p. 28.  
 1852. » » » — D'ORBIGNY, *Prodr. pal. Strat.*, III, p. 88.  
 1856. » *pertusa* Bast. — HERNES, *Foss. Moll. tert. Beck. Wien*, p. 133.  
 1867. » » » — DA COSTA, *Moll. foss. Portugal*, p. 80.  
 1873. » » » — COCCONI, *En. Moll. mioc. plioc. Parma e Piac.*, p. 131.  
 1877. » » » — LOCARD, *Faune terr. tert. Corse*, p. 51, 52.  
 1885. » *neglecta* Micht. — SACCO, *Catal. paleont. Bcc. terz. Piem.*, N° 3876.

+ LAEVI SULCOSA SACCO 1891

*Tortoniano*: Stazzano, Sagliano, S. Agata fossili (frequente).

OSSERVAZIONI — Generalmente venne finora confusa la forma in esame colla *Terebra pertusa* BAST., ed io stesso accetterei in parte (cioè dividendo la varietà *tortoniana* dalla specie tipica) questo modo di vedere se non fosse che questo nome di *pertusa* venne già usato dal BORN, oltre un secolo fa, per una *Terebra* vivente, che conserva tuttora questo nome. Quindi la *T. pertusa* BAST. non può conservarsi e ad esso sostituisco il nome di *expertusa*. Ma il nome di *T. neglectum* MICHT., istituito sin dal 1847, ha la priorità come specie tipica *tortoniana*, e quindi la *T. expertusa* dell'Elveziano ne deve diventare solo una varietà.

Sacco 1911 p. 27



63.	neglectum (Micht.)	Stazzano	1847
64.	var. expertusa Sacc.	Colli torinesi	1891
65.	var. carinatoides Sacc.	"	"

**278. Terebra (Myurellina) neglecta MICHELOTTI 1847**

Taf. 45, Fig. Nr. 278

- \* 1847 *Terebra neglecta* MICHELOTTI, *Naturk. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem*, 2. Vers. 3 : 214, Taf. 17, Fig. 8  
 ? 1916 *Terebra* cfr. *pertusa*, — NÖRREGAARD, *Danm. Geol. Unders.* (4) 5 : 31 [non BASTEROT]  
 . 1925 *Terebra neglecta*, — KAUTSKY, *Abh. pr. Geol. L.-Anst.* (N. F.) 97 : 194, Taf. 12, Fig. 22  
 v. 1952 *Terebra (Terebra) neglecta*, GLIBERT, *Gastrop. Mioc. Belg.* : 138, Taf. 10, Fig. 8

Beschreibung: Gehäuse mittelgroß, schlank, hoch turmförmig, rechtsgewunden.

Protoconch liegt nicht vor.

Teleoconch: Es liegen nur Bruchstücke vor. Zahlreiche (mehr als 10) niedrige, breite, durch schiefe Nähte getrennte, fast senkrecht abfallende Umgänge.

Die obere Naht ist von einem breiten Nahtband begleitet, das nicht ganz 1/3 der Umgangshöhe einnimmt, und durch eine schmale, tiefe Furche vom übrigen Umgangsteil abgetrennt wird.

Die Skulptur besteht aus schmalen Falten, die sich in unregelmäßigen Abständen erheben und auf dem Nahtband schräg nach hinten laufen, unter der Furche noch stärker nach hinten biegen und dann zurückbiegen und zur unteren Naht laufen, jedoch nicht mehr so weit nach vorn kommen, wie sie an der Nahtbandfurche waren.

Mündung gerundet dreieckig, mit kurzem, gedrehtem Kanal. Spindel winklig gebogen, unten am Kanal mit einer leistenartigen Verdickung.

Vorkommen in der Reinbek-Stufe: selten. Reinbeker Schichten: Reinbek; Twistringer Schichten: Woltrup, Twistringen, Hassendorf; Bislicher Schichten: Dingden, Bislich, Veen.

ANDERSON 1964 p. 320



Fig. Nr. 278

*Terebra (Myurellina) neglecta* MICHELOTTI 1847  
 Twistringer Schichten, Woltrup  
 Sammlung ANDERSON, Kat. Nr. Wp 13