

SPINEOTEREBRA SPINULOSA (DOD.).

(1862. DODERLEIN, *Giacitura terr. mioc. Italia centr.*, p. 23).

(Tav. II, fig. 63).

Testa parva, fusoido-scalarata, subalbida, apice acutissima. Anfractus suturam versus inflato-subcarinati, tuberculis spinosis (in anfractu ultimo 10-12 circiter) ornati, ad suturam depressi; in regione ventrali supera sublaeves, in regione ventrali infera nodulis spinulosis (superis depressioribus) muniti. Apertura parva, subelliptica.


Long. 13-25 Mm. Lat. 4-7 1/2 Mm.

1890. *Terebra Cosentini* Phil. var. *spinulosa* Dod. — SACCO, *Catal. paleont.* N° 5406.

Tortoniano: Stazzano, S. Agata fossili, Montegibbio (non rara).

OSSERVAZIONI. — Assai interessante sia geologicamente, poichè quasi caratteristica del Tortoniano, sia perchè, mentre con forme di passaggio sembra tendere da un lato verso la vivente *Euryta Cosentini*, dall'altro si collega invece coll'*Hastula Algarbiorum*, da cui distinguesi specialmente per la spinosità dei suoi tubercoli subsuturali.

Sacco 1891 p. 58



63. <i>Spineoterebra spinulosa</i> (Dod.)	Montegibbio	Museo geol. di Modena.
64 a, b. " " var. <i>subalgarbiorum</i> Sacc.	Stazzano	Museo geol. di Torino.
65. " " var. <i>rarispinosa</i> Sacc.	S. Maria (Tortonese)	Museo geol. di Roma.
66. " " var. <i>paucispinosa</i> Sacc.	Montegibbio	Museo geol. di Modena.
67 a, b. " " var. <i>cosentinoides</i> Sacc.	Tetti Borelli	Museo geol. di Torino.
68. " " var. <i>parvoaspina</i> Sacc.		



20. SPINEOTEREBRA SPINULOSA, (Doderl.). Stazzano Mioc. gr. nat.
 COSSMANN 8896 pl. 4