

632. *T. STRIOLATA* (N.), V. striolée.

*T. Testa glaberrima, nitidissima; anfractus sexdecim, planatis, striolis exiguissimis transversis, approximatis, flexuosis sculptis.*

Coq. très lisse, fort luisante; à seize tours de spire plans, sculptés de très petites stries transverses, rapprochées, flexueuses, dont celles du sommet plus en relief. Long. 0,065. Séj. Fossile à Magnan. Elle diffère de la *T. cinerea* de Linnée, parce que ses tours de spire sont tous traversés de stries, et non de plis, de la *T. plicatula* de Lamark par ses autres caractères.

Risso 1826 p 241

AJOUTER FIGURE →

*S. FUSCATA* var. *STRIOLATA* (Risso).1826. *Terebra striolata* Risso — RISSO, *Hist. Nat. Europe mérid.* Tom. IV, p. 241, tav. VI, fig. 74.1848. » » » — BRONN, *Ind. pal.*, p. 1227.*Piacenziano*: Magnan (rara?).

OSSERVAZIONI. — La forma sopra indicata dal Risso è forse solo una varietà della *S. fuscata*, ma la breve descrizione e la figura imperfetta non permettono un sicuro giudizio in proposito; la linea subsuturale, che non è affatto indicata, forse è solo poco appariscente, come si osserva in alcuni esemplari del Pliocene piemontese. Sacco 1891, 8

Sacco

= FUSCATA