

*80. *Terebra (Myurella) subatorquata* n. sp.

Char. Maxime affinis *T. (Strioterebrum) atorquatae* Sacco. Differt a *T. bistrata* Grat. sulco subsuturali deficiente, ab ambabus statura multo graciliore, anfr. omnibus pro ratione latitudinis altioribus. — *T. major*, subuliformis, gracillima. Anfr. plus quam 17 convexiusculi, pro genere alti, infra suturam bene impressam, subundulatam vix impressi, verticaliter costulati, costulis ca. 18 compressis, angustis, acutis, arcuatis, in anfr. ultimo sigmoideis, nec non in interstitiis spiraliter crebre distincteque sulcatuli. Anfr. ultimus penultimo fere sescuplo major, basi acuminatus, fere subrostratus, $\frac{1}{3}$ altitudinis testae aequans. Apert. subtriangularis angusta, margine sinistro expanso, distincte circumscripto, basali breviter canaliculato, canali compresso subeffuso, columella longiuscula, levissime torta.

Alt. 40, diam. max. vix $5\frac{3}{4}$ mm; alt. apert. 6, lat. apert. $2\frac{3}{4}$ mm.

Fundort. Kostej: Fântâna bătrîna nur 1 erw. St. mit abgeriebener Spitze.

Bemerkung. Der Hauptunterschied dieser Form von *T. bistrata* Grat. liegt in der grösseren Schlankheit der Schale, die daher rührt, dass alle Umgänge im Verhältnis zu ihrer Breite höher sind, und in dem gänzlichen Mangel auch nur der Andeutung einer Nahtbinde.

Boettger 1906 p 22



Abb. 10. *Terebra (Myurella) subatorquata* BOETTGER. Holotypus. Kostej, Fântâna bătrîna. (XII 2227 a). $\frac{1}{3}$ 276

391. *Terebra (Myurella) subatorquata* BOETTGER. Taf. 22 Abb. 10.

1906 *Terebra (Myurella) subatorquata* n. sp., BOETTGER, Kostej III, S. 22, Nr. 80. Holotypus: Taf. 22 Abb. 10. Senck.-Mus. (XII 2227 a). Locus typicus und einziges Vorkommen: Kostej; Fântâna bătrîna.

Zilch 1934 p 4c