

HASTULA SUBCINEREA (D'ORB.).

(1825. BASTEROT (*Terebra cinerea* L.) *Bass. tert. S. O. France*, p. 52. Tav. III, fig. 14).  
(1852. D'ORBIGNY, *Prodr. Pal. strat.* Vol. III, p. 87).

(Tav. II, fig. 42).

- 1820. *Terebra cinerea* Linn. — BORSON, *Oritt. piem.*, p. 44 (223).
- 1830. " " " — " *Cat. rais. Coll. min. Turin*, p. 614.
- 1847. " *strigilata* Lk. — SISMONDA, *Syn. meth.*, 1<sup>a</sup> ed., p. 41 (pars).

Long. 10-40 Mm. Lat. 2 1/2-9 Mm.

*Elveziano*: Colli torinesi, Sciolze, Baldissero (frequentissima).

OSSERVAZIONI. — Questa specie venne generalmente confusa finora colla sua derivata pliocenica, cioè coll'*H. Farinesi*, e specialmente colle sue varietà pieghettate presso la sutura. A dire il vero gli autori si sono pochissimo occupati di questa specie riguardo al Piemonte, mentre invece molto si intrattennero sulla forma pliocenica affine, cioè sull'*H. Farinesi* e sue varietà. Infatti solo il SISMONDA nella 1<sup>a</sup> edizione della sua *Synopsis* indica pure Torino come luogo di rinvenimento della *T. strigilata* (la quale non è altro che una varietà dell'*H. Farinesi*). Quindi sarà opportuno considerare in proposito la sinonimia e le osservazioni fatte riguardo a tali forme plioceniche, giacchè esse interessano pure la specie in esame.

Fu primo il BASTEROT che figurò questa specie, attribuendola erroneamente alla vivente *Terebra cinerea* LINN., per cui il D'ORBIGNY, prendendo a tipo la suddetta figura, le diede un nome nuovo, *T. subcinerea*, che deve quindi essere adottato. Quanto al nome di *T. subplicatula*, nome creato dal D'ORBIGNY poche pagine dopo quello di *T. subcinerea* e che potrebbe forse supporre di far confusione con detta specie, non la riguarda affatto, essendo fondato sopra una figura del GRATELOUP, che non rappresenta neppure un'*Hastula*, ma bensì un *Terebrum*.

Il tipo di questa specie è essenzialmente *elveziano*; solo scarsamente veggonsi apparire nel *Tortoniano* e nel Pliocene individui che parrebbero ancora rappresentarlo, ma generalmente essi mostrano le suture meno spiccate, più oblique (per un più rapido sviluppo degli anfratti), la forma più subulata, meno scalarata, gli anfratti leggermente convessi, più depressi alla base, ecc. Contuttociò debbo convenire come esista un nesso strettissimo tra l'*H. subcinerea* e l'*H. Farinesi*; ma per quanto graduale sia il passaggio che esiste fra queste due forme, sembrami logico il distinguerle specificamente.


Il GRATELOUP, come già dissi altrove, nel suo noto *Atlas* del 1841, confuse l'*H. subcinerea* coll'*H. costulata*; della prima possiamo conservare la var. *crenulata* (Pl. 35, fig. 25 f) e *sublaevigata* (Pl. 35, fig. 25 c, e) che egli ha ben stabilite; forme alquanto affini a queste due varietà esistono pure nell'*Elveziano* piemontese.

I signori R. HERNES ed AUINGER nella loro recente Monografia « *Gastrop. I u. II Mioc. Med. stuf.* » imbrogliarono ancora più la sinonimia di questa specie, dando ad essa il nome nuovo di *Terebra cinereides*, nome affatto da abbandonarsi, almeno come nome specifico, poichè l'esemplare da essi figurato rappresenta soltanto una varietà di *H. subcinerea*, varietà che ricorda la var. *lateplicata* e tende verso l'*H. Algarbiorum*. Quanto alla forma che essi appellano *Terebra striata* BAST., essa è probabilmente a considerarsi come una varietà di *H. Algarbiorum*.

Noto poi ancora che a maggior confusione molti esemplari di questa specie erano determinati, nelle varie collezioni, come *Terebra striata* BAST. o come *T. subflammea* D'ORB.

Quantò ai paragoni della specie in esame con forme viventi, veggasi quanto in proposito si dice trattando dell'*H. Farinesi*.

Sacco 1891 p 50



+ CINECEIDES HERNES

HOERNES & AUINGER 1880

42.	"	subcinerea (D'Orb.)	Colli torinesi	"
42 bis.	"	var. taurosemilaevis Sacc.	"	"
43.	"	var. pseudofarinesi Sacc.	"	"
44.	"	var. subconoidalis Sacc.	"	"
45.	"	var. brevicauda Sacc.	Astigiana	"
46.	"	var. scalarinula Sacc.	"	"
47.	"	var. lateplicata Sacc.	Stazzano	Museo geol. di Roma.
48.	"	var. inflatulina Sacc.	Sciolze	Museo geol. di Torino
49.	"	var. rectilinearis Sacc.	Colli torinesi	"

17 *H. subcinerea*  
BOUCHÉ ET 1931