

TEREBRUM SUBTESSELLATUM (D'ORB.).

(Tav. I, fig. 51).

Testa turrata, subulata, exerta; anfractibus planulatis; linea penes suturam impressa; plicis longitudinalibus minutis, frequentibus, undulatis, penes suturam evanidis (MICHELOTTI).

- 1820. *Terebra strigilata* Linn. var. — BORSON, *Oritt. Piem.*, p. 43-44 (222-223) (pars).
- 1847. » *tessellata* Micht. — MICHELOTTI, *Foss. Mioc.*, p. 215. Tav. 17, fig. 13.
- 1847. » » » — SISMONDA, *Syn. meth.*, 2^a ed., p. 28.
- 1852. » *subtessellata* D'Orb. — D'ORBIGNY, *Prodr. Pal. Strat.*, tom. III, p. 88.
- 1856. » *acuminata* Bors. — HCERNES, *Foss. Moll. tert. Beck. Wien*, p. 130, 131.
- 1861. » » » — MICHELOTTI, *Et. Mioc. inf.*, p. 131.
- 1867. » » » — PEREIRA DA COSTA, *Moll. foss. Portugal*, p. 79.
- 1890. » » » (T. *subtessellata* D'Orb.) — SACCO, *Catal. paleont.* N° 3871.

Long. 20-70 Mm. Lat. 4-12 Mm.

Tongriano: Dego, Mornese (fide Michelotti).

Elveziano: Colli torinesi, Sciolze (frequentissima).

OSSERVAZIONI. — Rimasi dapprima alquanto incerto se dovessi considerare questa forma come una varietà del *T. acuminatum* o come una specie a parte; mi tenni poscia a questa seconda opinione, perchè, pur essendovi numerosi punti di contatto e di eguaglianza fra la suddetta forma pliocenica e quella miocenica ora in esame, generalmente questa si distingue per essere più piccola e meno scalarata, per avere il cingolo subsuturale meno elevato e meno spiccatamente granuloso, il solco subsuturale più profondo, ecc., ecc. Tali differenze però esistono solo se si prendono come tipo della forma in esame le figure del MICHELOTTI, giacchè nel Miocene le Terebre di questo gruppo sono sommanente variabili.


Il nome di *T. tessellatum* Micht. non può essere conservato, avendo il GRAY sin dal 1834 pubblicata una *T. tessellata*, forma assai diversa, di Sumatra. Sacco 1711 p 4

La *Terebra Speyeri* FUCHS (FUCHS — *Kennt. Conch. Fauna Viant. tert. Geb.*, p. 49, tav. X, fig. 1, 2) non è forse altro che una varietà del *T. subtessellatum*. Appartiene pure a questa specie od al più ne costituisce una var. *detmoldensis* SACC. la *T. fuscata* BROCC. sec. SPEYER (Ob-Olig. Tert. Geb. Detmold., p. 13, tav. I, fig. 7), mentre invece la fig. 8 a, b dello stesso lavoro si avvicina forse meglio alla *Subula plicaria*, di cui costituirebbe una var. *fuscata* SACC. Sacco p 25 (1891)

N. NOVUM FOR

TESSELLATA MICH. 1847

+ PETURRITOIDES SACCO 1891
SPEYERI FUCHS



51.	subtessellatum (D'Orb.) (esemplare tipico della collezione Michelotti)	Colli torinesi	Museo geol. di Torino.
52.	var. <i>perturrita</i> Sacc.	"	"
53.	var. <i>torquata</i> Sacc.	"	"
54.	var. <i>procingulata</i> Sacc.	"	"
55.	var. <i>neglectocingulata</i> Sacc.	"	Collez. Rovasenda.
56.	var. <i>strioteretroides</i> Sacc.	Sciolze	"
57.	var. <i>columnostriata</i> Sacc.	Colli torinesi (Grangie)	"
58.	var. <i>pseudosuffcata</i> Sacc.	"	"
59.	var. <i>tubulosa</i> Sacc.	Bersano (La Morra)	"
60.	var. <i>asulcosa</i> Sacc.	Colli torinesi (V. Forzano)	"

Sacco 1891 p. 25