


DODERLEIN 1862
SACC 1891
MANZONI 1869

TEREBRUM TUBERCULIFERUM (DOD.).

(1862. DODERLEIN (*Terebra nodulosa*)? *Giacit. terr. mioc. It. centr.*, p. 23).
(1869. MANZONI, *Fauna mar. due lembi mioc. Alta Italia*, p. 485. Tav. 1, fig. 7).

Su questa forma dobbiamo fare due osservazioni; anzitutto che il MANZONI figurò a tipo della specie un esemplare a doppia serie di tubercoli subsuturali, mentre (come già osservò il COPPI « *Paleont. mod.*, 1881, p. 40) gli esemplari più comuni e tutti quelli da me osservati ne hanno una sola serie (var. *exnodulosa*); quindi si è ora obbligati a ritenere come tipo ciò che in realtà è una varietà rarissima. Inoltre a questa forma il DODERLEIN aveva dato il nome di *T. nodulosa*; fu in seguito il MICHELOTTI che, forse per *lapsus calami* suo o di DODERLEIN, classificò in diverse raccolte questi esemplari come *T. tuberculifera* DOD.; così originossi la determinazione del MANZONI.

SACC 1891 p 23



47.	"	tuberculiferum (Dod.)	var. exnodulosa Sacc.	Montegibbio	Museo. var. di Genova
48.	"	"	" (juv.)	"	"
49.	"	"	var. pertuberculifera Sacc.	"	Museo geol. di Modena.
50.	"	"	var. subanodulosa Sacc.	"	Museo geol. di Roma.