

006

ACUMINIA

DALL 1908

T. S. LANCEATA

1908 *Acuminea* Dall, *Nautilus*, vol. 21, pp. 124, 125. Type
Terebra lanceata Linne. DAEVSCH 1913 b11

Subgenus (and section) **ACUMINIA** Dall. (OF *TEREBRA*)

Young with flat axially regularly ribbed whorls, blunt at the suture without sutural band or sulcus, shell slender, many whorled, the adult smooth, the columellar lip bare, with no canal, but a deep siphonal sulcus. Type *Terebra lanceata* (Linné).

This section of *Subula* is remarkable for the total absence of the presutural sulcus. DALL 1907 b

***Acuminea* Dall, 1908 (nov.). *T. lanceata* (Linné).**

C. Sulcus wholly absent. Subgenus *ACUMINIA*.

10. Adult slender, smooth. Section *Acuminea*.

DALL 1907 c

Genus *Acuminea* Dall, 1908 シマタケ属

Type species: *Buccinum lanceatum* Linnaeus シマタケ

原殻はミガキタケ属に近い。彫刻は幼層に縦肋、後螺層の下半が平滑となり、更に全く平滑になる点はムラクモタケ属と同様であるが、殻形が異なる。ムラクモタケ属は鋭い円錐形であるが、シマタケ属ではやゝ紡錘形となる。又ヤナギンボリタケにはピンで刺したような刻点も生ずる。

殻形や光沢が強いことはベニタケ属にやゝ近いが、本属は縫合下帯が出来ず、幼層の彫刻も異なる。

A. lanceata (Linnaeus, 1767)

シマタケ

A. penicillata (Hinds, 1843)

ヤナギンボリタケ

04A71A 1961 Venus 21 p184

Acuminea Dall, 1908, *Nautilus* 21 (1): 124. Type species, *Terebra lanceata* Linnaeus, 1767 = *Hastula lanceata* (Linnaeus), recent, Indo-Pacific. "Sulcus wholly absent. Adult slender, smooth."

65c 1987

Acuminea Dall, 1908 シマタケ属

本属も熱帯性でサンゴ礁が発達する地方の浅海に棲む。

A. lanceata (Linnaeus, 1767) シマタケは熱帯地方から奄美大島まで分布する。

A. penicillata (Hinds, 1844) ヤナギンボリタケも熱帯地方に産し、東が報告した高知県西南部が分布の北限である。 04A71A 1961 Venus vol 21 p184