

Genus *Cinguloterebra* n. g. シロコニクタケ属

Type species: *Terebra hedleyana* Pilsbry シロコニクタケ

原殻はシラタケ属と同様で、原殻と幼層との区別はむづかしい。幼層には1階の間に先ず縦肋を生じ、次いで肋間に縫合下帯を区切る刻点列を生ずるが間もなく肋上を切る。次の螺層から縦肋は漸次弱まり、又縫合下帯の下にも肋の隘れを生ずるから、これらが後2帯の顆粒の列に発達する。縦肋が弱まると螺肋が発達し、一見螺肋ばかりで縦肋を欠く貝のように見える。

*C. hedleyana* (Pilsbry, 1905) シロコニクタケ

*C. jeffreysii* (Smith, 1879) ツクシタケ (新称)

Syn. "*Terebra loebbeckeana* Dunker" Hirase, 1917

*C. ? monilis* (Quoy et Gaimard, 1833)

シロフシタケ (シロイボニクタケ)

*C. ? tricolor* (Sowerby, 1825) var. キスヂニクタケ

*C. ? serotina* (Adams et Reeve, 1848) ヒメキリガイ

*C. ? torquata* (Adams et Reeve, 1848) ヤスリギリ

OYAMA 1961 VENUS 21 183

009

CINGULOTEREBRA A)

OYAMA 1961

T. S. HEDLEYANA

*Cinguloterebra* Oyama, 1961, Venus 21 (2): 183. Type species, *Terebra hedleyana* Pilsbry, 1905 = *T. adamsi* E. A. Smith, 1873, recent, Western Pacific. B & C 1987