

Sous-genre. EURYTA, H. et A. Adams, 1853. Établi aux dépens des buccins.
— Coquille turriculée, subfusiforme, lisse. Tours légèrement plissés, le dernier un peu ventru. Columelle prolongée antérieurement, tordue en spirale, formant un faux ombilic jusqu'au sommet de la spire. Ouverture assez large. Ex. : *E. granulosa*, Lamarck; *E. aciculata*, Lamarck.

LAMARCK 1822 | 210

EURYTA

ADAMS H & A 1853

T S. ACICULATA

GENUS ACUS

Sub-gen. EURYTA, H. and A. Adams.

Shell turreted, subfusiform, smooth, whorls nodosely plicate, the last rather ventricose; columella spirally twisted, forming a false umbilicus pervious to the apex of the spire, much produced anteriorly; aperture somewhat effuse.

aciculata, Lam.

Consentini, Phil.

fulgurata, Phil.

granulosa, Lam. ADAMS H & A 1853 | 225

EURYTA, H. et A. Adams, 1853.

Forme fusioïde ou buccinoïde, peu allongée; embryon composé de deux tours lisses, à nucléus obtus et dévié; tours embrassants, élevés, ornés de côtes binoduleuses ou subépineuses; dernier tour grand, à base parfois sillonnée. Ouverture étroite, avec une gouttière postérieure et un canal antérieur; labre à peu près vertical, légèrement sinueux vis-à-vis de la rangée supérieure de nodosités; columelle hélicoïdale, se raccordant par un arc très ouvert avec la base de l'avant-dernier tour, infléchie près de l'échancrure basale qui est très large.

Diagnose refaite d'après un individu du type vivant aux Antilles, *T. aciculata*, Lamk. var. *nodosoplicata*, Dunk. (Pl. IV, fig. 12), ma coll.

COSSMAN 1896 | 54-55

EURYTA (*sensu stricto*) H. et A. Adams, 1853: Type: *T. aciculata*, Lamk. Cette coupe doit être génériquement séparée des *Terebra*, non seulement à cause de la forme courte de la spire et de l'aspect bucciniforme de l'ouverture, mais encore à cause de l'ornementation épineuse des tours de spire, et de l'embryon qui est obtus, court et dévié. La forme typique n'existe pas à l'état fossile: mais on peut y rattacher le sous-genre *Spineoterebra*.

COSSMAN 1896 | 447

Euryta H. and A. Adams, 1853, Gen. Rec. Moll. 1: 225. [non *Euryta* Gistel, 1848]. Type species, *Terebra aciculata* Lamarck, 1822, recent, Atlantic. Examples: *aciculata* Lam., *cosentini* Phil., *fulgurata* Van., *granulosa* Lam." This genus is *Mazatlanian* Dall, 1900, which belongs to the Columbellidae as it has a columbellid radula.

S & E 1987