

TEREBRA BUCCINOIDEA, Blainv.

DZSH 1859 p 316

Nom donné par Blainville au *Miran* d'Adanson, *Buccinum politum*.

BUCCINOIDEA

BLAINVILLE

1825

224

EXCLUENDAE

** Les *E. turbinacés*, ou dont la spire est médiocrement allongée, rarement subturriculée.

Vis. *Terebra*.

Animal spiral assez élevé; le pied ovale avec un sillon transverse antérieur, et deux auricules latérales; la tête bordée d'une petite frange; tentacules cylindriques terminés en pointe, et fort distans; yeux peu apparens à l'origine et au côté externe des tentacules; bouche sans trompe; le tube de la cavité respiratrice très-long.

Coquille non épidermée, ovulaire, à spire aiguë, assez peu élevée, ou subturriculée; ouverture large, ovale, fortement échan-crée en avant; la columelle chargée d'un bourrelet oblique à son extrémité.

Opercule nul.

Ex. La Vis Miran. *Terebra buccinoidea*. Pl. XVI, fig 3, et Adans, Sénag., pl. 4.

Observ. Nous ne laissons dans ce genre, qui devrait peut-être passer dans la famille des entomostomes non operculés, que les espèces de vis de M. de Lamarck, qui, par leur forme générale, ont quelque ressemblance avec les buccins, comme sa vis buccinée, parce que nous supposons que l'animal ressemble à celui du miran d'Adanson, qui en est le type, et qui diffère beaucoup de celui des vis subulées, dont nous proposons de faire le genre Alène.

Les espèces de ce genre paroissent aussi n'appartenir qu'aux mers des pays chauds; on doit y rapporter la vis scalarine fossile de Parnes.

Blainv. 1825 p 406

Buccinoidea (*Terebra*), Blainville. Desh., Zool. Proc., 316, 1859. = Bullia, Manual, iv, 39

TRYON 1885

Terebra buccinoidea Blainville 1824, Dict. Sci. Nat. 32: 206.

This is a synonym of *Bullia vittata* (Linnaeus, 1767), family Nassariidae.

EXCL

B2 14