

EXCLUDED

NOT A TEREBRID! = BULLIA TURRITA GRAY

27. TEREBRA BUCCINULUM. Desh. (Pl. V, fig. 12.)

p 92

T. testa elongato-turrita, brevicula, acuminata, albo-griseola; anfractibus convexiusculis, latis, integris, ad suturas tenue longitudinaliter plicatis, transversim sub lente minutissime striatis; apertura ovato-oblonga, extremitatibus attenuata, antice profunde emarginata; columella concava, brevi, uniplicata, extus tristriata, basi margine angusto obtuso circumdata.

Hab. l'Australie, cote orientale.

La forme generale de cette espèce rappelle un peu celle des Buccins allongés, tels que le Vittatum de Linné et autres du même groupe; par la coloration, elle semblerait se rattacher à la série de variétés du Terebra Jamaicensis; mais elle diffère suffisamment de toutes ses congénères pour constituer un type-spécifique distinct. Elle est allongée, turriculée, courte cependant relativement au diamètre de sa base; ses tours sont larges, médiocrement convexes, plus cependant que dans les autres espèces; elle paraît lisse; mais, vue à la loupe, on y remarque de petits plis qui partent de la suture et disparaissent bientôt vers le milieu; ils n'existent plus sur le dernier tour. Des stries transverses, extrêmement fines et serrées, occupent toute la surface, il faut s'armer d'une loupe pour les apercevoir; l'ouverture est ovale, oblongue, atténuée à ses extrémités, terminée en avant par une échancrure assez étroite et profonde. Le plan de l'ouverture est oblique à l'axe. La columelle est courte, large à la base; elle porte en dedans un pli très-oblique et au dehors trois stries au-dessous desquelles s'élève un bourrelet peu épais et un peu saillant qui la circonscrit au dehors. La coloration est d'un fauve très-pâle, lavé de gris.

Cette coquille a 37 mill. de long et 10 de diamètre.

Collection de M. Cuming. DESH 1857 p 92



81

Terebra buccinulum Deshayes, 1857, Journ. Conchyl. 6: 92, pl. 5, fig. 12. This is a member of the genus Bullia, family Nassariidae. The locality of "East coast of Australia" is erroneous. EXCL B287

TEREBRA BUCCINULUM Deshayes.

Terebra buccinulum Deshayes, Proc. Zool. Soc., 1859, p. 282; Id., Reeve, Conch. Icon., xii., 1860, Pl. xx., fig. 101.

This species was described from "East Australia," but it apparently does not occur here. In the British Museum, under the genus Leiodomus of Swainson, are two specimens marked "type Bullia turrita Gray, Zool. Beechey's Voy., Reeve Conch. Icon. sp. 16." Except in colour, these are identical with one marked "type, Terebra buccinulum Deshayes, East coast of Australia, Journ. de Conch., 1857, vol. vi., f. 9." DESH 1857 p 92

34. TEREBRA BUCCINULUM, Desh.

T. testa elongato-turrita, brevicula, acuminata, albo-griseola; anfractibus convexiusculis, latis, integris, ad suturas tenue longitudinaliter plicatis, transversim sub lente minutissime striatis; apertura ovato-oblonga, ad extremitates attenuata, antice profunde emarginata; columella concava, brevi, uniplicata, extus tristriata, basi margine angusto obtuso circumdata. Long. 37 mill., larg. 10.

Hab. La cote orientale de l'Australie. Collection Cuming.

DESH 1857 p 92

Species 101. (Fig. a, Mus. Taylor, Fig. b, Mus. Cuming.)


TEREBRA BUCCINULUM. Ter. testâ subulatâ, ad basin ventricosâ, albâ vel pallidâ castaneâ, anfractibus declivius convexis, lœvibus, indivisis; aperturâ ovatâ, columellâ appressè arcuatâ.

THE BUCCINUM-LIKE TEREBRA. Shell subulate, ventricose at the base, white or pale chestnut, whorls slopingly convex, smooth, undivided; aperture ovate, columella appressly arched.

DESHAYES, Journ. de Conch. 1857.

Hab. East coast of Australia.

A smooth species, intermediate in its character between Terebra and Buccinum. RV 1860



101b

101a

Buccinulum (Terebra), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 92, pl. v, f. 12. = Bullia turrita, Gray. Manual, iv, 14.

TRAYN 1885

39

43. buccinulum, Terebra - DESHAYES, 1857. J. C. P. 6: 92, pl. 5, fig. 12. Hab. l'Australie, cote orientale. Coll. Cuming. Size: 37 10 mm. Lectotype: 37.1 mm; syntypes: 36.9 mm, 36.0 mm, and 36.0 mm. This is the same species as Bullia turrita GRAY, 1839. C69

34. T. buccinulum Desh. J. Conchyl., vi, 92, pl. v, f. 12. Australie (cote orientale). Coll. Cuming, but no longer there. T44

TEREBRA BUCCINULUM, Desh., described in the 'Journal de Conchyliologie,' 1857, vol. vi. p. 92, pl. v. fig. 12, and refigured by Reeve in the 'Conchologia Iconica,' vol. xii. Terebra, fig. 101 b, is the same species of shell as that figured by the latter author, in his monograph of the genus Bullia, as B. turrita, Gray. Of this there can be no doubt, as I have before me the actual examples that are figured and cannot trace the slightest difference.

Messrs. H. & A. Adams (Gen. Rec. Moll. i. p. 114) place turrita, Gray, as a Leiodomus, Swainson (as restricted by them), a subgenus of Pseudostrombus, where at present it may be convenient to let it remain; for certainly this shell has more affinity to the Bullia group than to the Terebridae. SMITH 1873 p 262