

23. Vis granuleuse. *Terebra granulosa*.

T. testá conico-acutá, subturritá, longitudinaliter et obliquè striatá, striis minutis impressis distantibus cinctá, cinereo-lutescente aut cærulescente; anfractibus convexis, prope suturas biserialim granulosis: ultimo lævigato, basi striato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Elle a quelquefois une petite fascie bleuâtre au sommet de ses tours. Longueur, 14 lignes.
LAM 18 26 p 227 1

EXCLUDENDÆ

GRANULOSA

LAM 1822

EXCL
NST

23. Vis granuleuse. *Terebra granulosa*. Lamk. p 40

T. testá conico-acutá, subturritá, longitudinaliter et obliquè striatá, striis minutis impressis distantibus cinctá, cinereo-lutescente aut cærulescente; anfractibus convexis, prope suturas biserialim granulosis: ultimo lævigato, basi striato. P & N-E-1845 p 250

* *Buccinum vittatum*, Var. Kiener. Spec. des Coq. p. 25. pl. g. f. 30. Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Elle a quelquefois une petite fascie bleuâtre au sommet de ses tours. Longueur: 14 lignes.

D & MIE 1845 p 250

TEREBRA GRANULOSA, Lamk. 1822 p 40

C'est un *Buccinum* du groupe des *Bullia*. DZSH 1859 p 318

EXCLUDENDÆ.

T. GRANULOSA, Lamarck, Hist. des Animaux. v. vii. p. 291. HNS 446 p 186

Excludendæ.

135. TEREBRA GRANULOSA, Lamarck. HNS 446 p 186

Granulosa (*Terebra*), Lam. Anim. s. Vert., v. vii, p. 291.

= *Bullia*, Manual, iv, TAYLOR 1885. 39

Terebra granulosa Lamarck, 1822, Hist. Nat. Anim. S. vert. 7: 291. This is the West African *Dorsanum* (*Fluviodorsum*) *granulosum*, family Nassariidae. (EXC) 82 87



Fig. 1213.
E. granulosa.
CHEN 1759