

3. TEREBRA NODOSPLICATA, Dunker.

Terebra nodosoplicata, Dunker, Zeits. für Malac. 1853, p. 110.

no. 37.

Hab. — ?

DES 1859 p 236

EXCLUENDAE

NODOSPLICATA

DUNKER 1853

= ACICULATA

EXC

12. EURYTA NODOSPLICATA, (Dunker).

Antilles

Viv.

gr. nat.



COSSMANN 1896 pl 4

Terebra nodosoplicata Dunker, 1853, Zeit. f. Malakozool.: 10 (7): 110. This is a synonym of *Mazatlanina cosentini* (Philippi, 1836), family Columbelloidea.

31 87

37. *Terebra nodosoplicata* Dkr.

T. testa elongato-acuminata, alba, crassiuscula; anfractibus convexiusculis longitudinaliter et distincte costatis, costis saepius obsolete binodosis ad suturam profundam crenulatis, ultimo semicostato ad basin coarctato transversimque striato; apertura oblonga; columella subobliqua labro acuto haud producto longiore.

Alt. 7 1/2 lin., diam. max. 3 lin.

Patria ignota.

Testa laevissima, nitidissima, pellucens, alba unicolor vel in anfractus ultimi media parte fascia fusca signata. Anfractuum 10 celeriter crescentium ultimus dimidiam circiter testae partem occupat. Spira acuminata; anfractus embryonales duo laevigati subobtusii. Costarum numerus variabilis est, in anfractu ultimo plerumque 18 inveniuntur.

Haec cochleola magnam affinitatem praebet cum Buccino aciculato Lam. X. pag. 175, Kien. Tab. XVI. fig. 55. — Bucc. clavula Mke. *Terebra Cosentini* Phil. — quod vero, haud jungendum est cum Buccinis veris. Si habitum huius testae et ipsius formationem aperturae respicimus inter Terebras et Bullias intermedia esse videtur. Persuasum nobis est Terebram eburneam, nodoso-plicatam, Buccinum aciculatum nec non quartam nostrae collectionis speciem nondum determinatam sectionem Terebrarum vel genus proprium formare. DUNKER 1853. Zeit. f. Mal. p. 110.

3. *T. nodosoplicata*, Dunker, variety of *T. cosentini*, Philippi. AV 1890

Nodosoplicata (*Terebra*), Dunk. Zeit. f. Mal., 1853, p. 110.

= *T. aciculata*, Lam. 38

TRAYON 1885