

Virgini- 168. B. tella ex virefcente flava: fasciis duabus fanguineis, spi-
cum. rac anfractibus planiusculis, apertura ampla ovali.
List. Conch. t. 113. f. 7.
Martin. berl. Magaz. 4. p. 347. t. 10. f. 48.
Habitat in Virginiae fluviis. GML 1791 p 3505

EXCELUENDAE

VIRGINICA

VIRGINICUM

Bosc 1801

GML 1791

excl

NOT A TEREBA

BUCCINUM VIRGINEUM, Gmel. p. 3505. no. 168. DZSH 1217 p 3
C'est encore une *Melania* d'après la figure citée de Lister, pl. 113.

VIRGINEUM. 157. Shell turreted, with the whirls
of the spire flattish, and the aperture large
and oval.

Buccinum Virgineum. Gmelin, p. 3505. Schreibers Conch.
i. p. 173.

Buccinum, No. 217. Schroeter Einl. i. p. 414.

Helix, No. 74. Schroeter Einl. ii. p. 198.

Lister Conch. t. 113. f. 7. Petiver Gaz. t. 104. f. 8.

Martini Berlin Mag. iv. p. 347. t. 10. f. 48.

Inhabits rivers in Virginia. Lister.

Shell about an inch long, and one third as broad, of a greenish
yellow colour, with two transverse red bands. DZSH 1217 p 3

Vis de Virginie, *Terebra Virginica*.

D'un jaune verdâtre, avec deux fascies
rouges; les tours de spire aplatis; l'ou-
verture ample et ovale.

Lister, Conch. tab. 113. fig. 7. Martini,
Berl. Magaz. 4. tab. 10. fig. 48.

Se trouve dans les eaux douces de la Vir-
ginie. Bosc 1801 p 23

Terebra virginica Bosc, 1801, Hist. Nat. Coq. 5: 21, is a
generic re-assignment of the fresh water, pleurocerid spec-
ies, *Buccinum virgineum* Gmelin, 1791. 81. 22