

13. Vis striatule. *Terebra striatula*.

*T. testá turrítá, longitudinaliter et obliquè striatá, squalidè albidá aut pallidè fulvá, maculis fusco-cærulescentibus signatá; anfractibus convexiusculis, supernè sulco impresso divisis.*

Martini, Conch. 4. t. 154. f. 1447.

Habite... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

LAM 1822 p 288

13. Vis striatule. *Terebra striatula*. Lamk. (1)

*T. testá turrítá, longitudinaliter et obliquè striatá, squalidè albidá aut pallidè fulvá, maculis fusco-cærulescentibus signatá; anfractibus convexiusculis, supernè sulco impresso divisis.*

Martini. Conch. 4. t. 154. f. 1447. D 2146 1745 p 246

\* Küster. Conch. Cab. p. 5. n° 2. pl. 2. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Longueur : 2 pouces 4 lignes.

(1) Cette espèce ne se trouve pas dans l'ouvrage de M. Kienner, d'après la figure de Martini, à laquelle Lamarck renvoie; elle paraît une variété du Faval d'Adanson.

D. & M. E. 1845 p 246

Striatula (*Terebra*), Lam. Anim. sans Vert., v. vii, p. 288.

= *T. Senegalensis*, Lam. . . . . 1

TRAYON 1885

NOT IN B & C 87